

Nicotinell  
Lutschtabletten 1 mg Mint

96  
Lutschtabletten

Nicotinell  
Lutschtabletten 1 mg Mint

1 mg

1 mg

96 Lutschtabletten

Jede Lutschtablette enthält 1 mg Nikotin  
(als Nicotinbis(R,R)-tartrat] 2 H<sub>2</sub>O).  
Enthält Mannitol (E 965), Aspartam (E 951)  
und Natrium (9,8 mg pro Lutschtablette).  
Packungsbeilage beachten!

Zur Anwendung in der Mundhöhle.  
Lutschtablette nicht kauen oder schlucken.  
Vor der Anwendung bitte Packungsbeilage  
lesen.

Für Erwachsene über 18 Jahren.  
Wenn Sie vor Beginn der Behandlung einen Rat  
benötigen, wenden Sie sich an medizinisches  
Fachpersonal.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich  
aufbewahren!  
Nicht über 25 °C lagern.  
Apothekenpflichtig  
Zul.-Nr. S6670.00.00



PZN-03082013

GlaxoSmithKline  
Consumer Healthcare GmbH & Co. KG,  
80258 München

**Nicotinell**  
Lutschtabletten 1 mg Mint

Lutschtablette, gepresst  
Nikotin

Zur Unterstützung  
bei der  
Raucherentwöhnung

96  
Lutschtabletten

**Nicotinell**  
Lutschtabletten 1 mg Mint

**1 mg**



**Anwendungsgebiet:** Die Lutschtabletten können alleine oder in Kombination mit einem Nicotinell 24-Stunden-Pflaster angewendet werden. Bitte Packungsbeilage beachten. Zur Linderung von Nikotinentzugssymptomen, in Verbindung mit Raucherentwöhnung und Rauchreduktion bei Rauchern, die motiviert sind das Rauchen aufzugeben. Vor Anwendung beiliegende Packungsbeilage beachten. Eine Beratung und Betreuung des Patienten erhöhen in der Regel die Erfolgsraten.

**Welche Lutschtablette brauche ich?**

**Rauchen:**

- Weniger als 20 Zigaretten pro Tag: Nicotinell Lutschtabletten 1 mg Mint
- 20 bis 30 Zigaretten pro Tag: Sie können entweder Nicotinell Lutschtabletten 1 mg Mint oder Nicotinell Lutschtabletten 2 mg Mint anwenden
- Mehr als 30 Zigaretten pro Tag: Nicotinell Lutschtabletten 2 mg Mint

**Richtige Lutschtechnik beachten:**

1. Lutschtablette langsam lutschen, bis ein kräftiger, "pfeffriger" Geschmack entsteht.
2. Pause machen: Lutschtablette dabei zwischen Zahnfleisch und Wange "parken".
3. Wenn der kräftige Geschmack nachlässt, erneut mit dem Lutschen beginnen.
4. Diesen Lutsch-Rhythmus "Lutschen-Pause-Lutschen" den individuellen Bedürfnissen anpassen und bis zur vollständigen Auflösung der Lutschtablette wiederholen (ungefähr 30 Minuten).

Nicotinell  
Lutschtabletten 1 mg Mint

1 mg

1 mg

**Nicotinell**

Lutschtabletten 1 mg Mint

Lutschtablette, gepresst  
Nikotin



Zur Unterstützung  
bei der  
Raucherentwöhnung

96

Lutschtabletten

**Nicotinell**  
Lutschtabletten 1 mg Mint

**1 mg**



**96 Lutschtabletten**

Jede Lutschtablette enthält 1 mg Nikotin  
(als Nicotinbis[(R,R)-tartrat] 2 H<sub>2</sub>O).

Enthält Maltitol (E 965), Aspartam (E 951)  
und Natrium (9,8 mg pro Lutschtablette).  
Packungsbeilage beachten!

Zur Anwendung in der Mundhöhle.  
Lutschtablette nicht Kauen oder Schlucken.  
Vor der Anwendung bitte Packungsbeilage  
lesen.

Für Erwachsene über 18 Jahren.


Wenn Sie vor Beginn der Behandlung einen Rat  
benötigen, wenden Sie sich an medizinisches  
Fachpersonal.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich  
aufbewahren!

Nicht über 25 °C lagern.

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr. 56670.00.00



PZN -03062013

**gsk**

GlaxoSmithKline  
Consumer Healthcare GmbH & Co. KG,  
80258 München