

Imodium[®]

12 Tabletten

akut^N duo
Loperamidhydrochlorid und Simeicon

Imodium[®]

akut^N duo

Loperamidhydrochlorid und Simeicon

2 mg/125 mg Tabletten

Bei akutem Durchfall
mit Krämpfen und Blähungen.

12
Tabletten



Imodium[®]

akut^N duo
Loperamidhydrochlorid und Simeicon

12 Tabletten

Imodium[®]

aktul[®] duo

Loperamidhydrochlorid und Simeticon

12 Tabletten



Ch.-B.:

Verwendbar bis

Imodium

Imodium akut^N duo

2 mg/125 mg Tabletten

Für Jugendliche ab 12 Jahre
und Erwachsene

Zum Einnehmen.

Die empfohlene Anzahl
Tabletten wird unzerkaut mit
einem Glas Wasser
eingenommen.

1 Tablette enthält 2 mg
Loperamidhydrochlorid und
Simeticon entsprechend
125 mg Dimeticon.

Sonstige Bestandteile:

Wasserfreies Calciumhydrogen-
phosphat, mikrokristalline
Cellulose,
Carboxymethylstärke-Natrium
(Typ A) (Ph. Eur.), Acesulfam-
Kalium, Stearinsäure (Ph. Eur.)
[pflanzlich], künstliches
Vanille-Aroma.

**Bitte Packungsbeilage
beachten.**

**Arzneimittel für Kinder
unzugänglich aufbewahren.**

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr. 65706.00.00

Imodium[®]

akut^N duo

Loperamidhydrochlorid und Simeticon

12 Tabletten

Imodium[®]

akut^N duo

Loperamidhydrochlorid und Simeticon

12 Tabletten